

MÁS-RAÍZ[®] +

GUÍA DE USO

Ámbito de uso: Cultivos y problemas objetivo

MÁS RAÍZ[®] + puede aplicarse prácticamente sobre todos los cultivos.

Dosis e Instrucciones de uso

Cultivo	Momento de aplicación	Dosis y método	Observaciones
Todos los cultivos	En el momento de emergencia en el semillero	Foliar: 200-300 cc/hL (2-3 L/ha) Riego: 200-300 cc/hL (2-3 L/ha)	No debe mezclarse con productos extremadamente alcalinos
	Pueden tratarse los plantones por inmersión, antes de la plantación definitiva	Inmersión en una disolución de 500 cc /50 L de agua durante 12 horas.	
	Después del trasplante	Foliar: 200-300 cc/hL (2-3 L/ha) Riego: 200-300 cc/hL (2-3 L/ha)	
	Como bioestimulante en cualquier situación de estrés del cultivo (excesos de frío y calor, sequía, etc....)	Foliar: 200-300 cc/hL (2-3 L/ha)	

Formas de aplicación

a) Incorporación en el sistema de riego:

El producto puede aplicarse mediante incorporación en el sistema de riego, lo cual simplifica el tratamiento. Es muy importante utilizar una concentración de producto y un volumen de caldo elevado, ya que se trata de empapar abundantemente la base de la plantita a tratar.

b) Pulverización:

Es muy importante utilizar un volumen de caldo elevado, ya que se trata de empapar abundantemente la base de la plantita a tratar.

Debe prestarse atención a las recomendaciones específicas sobre la conveniencia de uno u otro método de aplicación.

c) Baño por inmersión de raíces:

Sistema de aplicación recomendado en el tratamiento de esquejes o estacas. También se recomienda en el trasplante de plantas procedentes de semillero o vivero. El material vegetal a tratar debe sumergirse en una solución de producto en agua durante suficiente periodo de tiempo.