

SERGOMAX[®] L90

GUÍA DE USO

Ámbito de uso: Cultivos y problemas objetivo

SERGOMAX[®] L90 puede aplicarse sobre los siguientes cultivos, a las dosis y según modo e instrucciones que se indican en la tabla adjunta.

Dosis e Instrucciones de uso

Cultivo	Problema	Nº de aplicaciones	Momento de aplicación	Método	Dosis	Observaciones
Viña	Activador (para provocar movida)	1	Febrero-Marzo	Riego	3-5 L/ha	En las aplicaciones foliares mojar bien, empleando 300-400 L de caldo por hectárea
	Enfermedades maderas (<i>Yesca, Eutipiosis, Excoriosis</i> , etc.)	2 - 3	1ª aplicación: Unos días después de la poda 2ª aplicación: Al brotar el año siguiente, cuando el sarmiento tenga un desarrollo de 40-50 cm 3ª aplicación: 40-50 días después de anterior.	Foliar	1ª aplic. 500 cc/100L 2ª aplic. 250-500 cc/100L 3ª aplic. 250-500 cc/100L	Tratamiento de choque, con enfermedad visible: 40 cc en pulverizador de mano de 1 L 150 cc en mochila de 15 L
		2	1ª aplicación: Al brotar el año siguiente. 2ª aplicación: A principio de julio	Riego	1ª aplic. 1,5-2,5L/ha 2ª aplic. 2-2,5 L/ha	500 cc/hL en tanque pulverizador

Cultivo	Problema	Nº de aplicaciones	Momento de aplicación	Método	Dosis	Observaciones
Uva de mesa	Activador (para provocar movida)	1	Febrero -Marzo	Riego	3-5 L/ha	Para provocar movida
	Enfermedades madera (Yesca, Eutipiosis, Excoriosis, etc.)	2 - 3	Cuando aparezca enfermedad o exista riesgo	Directo madera	300 cc/hL	Repetir aplicación cada 15-20 días. Aplicar también en savia descendente
				Riego	2-3 L/ha	
Frutales	Activador (para provocar movida)	1	Febrero - Marzo	Riego	3-5 L/ha	Para provocar movida
	Enfermedades madera (Gomosis, etc.)	Según riesgo	Cuando aparezca enfermedad o exista riesgo	Foliar	300 cc/hL	Repetir aplicación cada 15-20 días. Aplicar también en savia descendente
				Riego	3-5 L/ha	
Olivar	Activador	1	Febrero - marzo	Riego	3-5 L/ha	
	Para corregir vertería	1	Febrero - marzo	Riego	3-5 L/ha	
				Foliar	300 cc/hL	
	Enfermedades madera (Verticillium, Phytophthora)	Según riesgo	Cuando aparezca enfermedad o exista riesgo	Foliar	300 cc/hL	Repetir aplicación cada 15-20 días
				Riego	3-5 L/ha	
Para neutralizar lesiones recolección	1	Inmediatament e después recolección	Foliar	300 cc/hL		
Cítricos	Enfermedades madera (Gomosis, etc.)	2 - 3	Cuando aparezca enfermedad o exista riesgo	Foliar	300 mL/ 100 L	Repetir aplicación cada 15-20 días mientras exista riego
				Riego	3-5 L/ha	
Arroz	Para evitar bloqueos, estrés, etc.	2	1ª Antes de encañado 2ª Final del encañado	Foliar	1,5 L/ha	Puede aprovecharse cualquier otro tratamiento herbicida o fungicida que se efectúe
Algodón		1-2	10-15 días antes de la floración	Foliar	2L/ha	Si se requiere una segunda aplicación, realizarla 20-25 días después de la primera.

Formas de aplicación

a) Incorporación en el sistema de riego:

La sistemía y traslocación de permite la aplicación mediante incorporación en el sistema de riego.

b) Pulverización foliar:

En la aplicación foliar es muy importante utilizar un volumen de caldo adecuado para asegurar la cobertura uniforme de la vegetación a proteger. Es también importante que la presión, así como el tamaño de la gota de pulverización, permitan la penetración necesaria para proteger el interior de racimos y de la vegetación.

Debe prestarse atención a las recomendaciones específicas sobre la conveniencia de uno u otro método de aplicación